

■■訂正■■

本誌 31 巻 9 号 (2015 年 9 月号) 島田貴信先生, 藤井正人先生の論文の表 1 (1363 頁) におきまして以下のごとく, 間違いがございましたので赤字のごとく訂正を掲載いたします。

表 1 緩和的化学療法レジメンの概要

レジメン名称	用量・用法, 投与間隔, コース数	ORR	mPFS	mOS	嘔吐リスク	注意すべき有害事象
FP+CMAb ² (FC+CMAb)	CDDP 100 mg/m ² 2h で DIV day 1 (CBDCA 5 AUC 2h で DIV day ¹) 5-FU 1000 mg/m ² 24h 持続 DIV day 1-4 C-MAb 400 mg/m ² 2h で DIV day 1 (*) 250 mg/m ² 1h で DIV day 8, 15 3 w 毎最大 6 コース	36%	5.6 m	10.1 m	High (Intermediate)	腎障害, 末梢神経障害・難聴, 血液毒性, 血液毒性 (特に血小板減少), 粘膜炎, 下痢, 心障害, infusion reaction, 皮膚障害 (ざ瘡様皮疹, 爪囲炎), 心障害
FP ³	CDDP 100 mg/m ² 2h で DIV day 1 5-FU 1000 mg/m ² 24h で DIV day 1-4 3 w 毎 4-6 コース	29.8%	Not reported	8.7 m	High	腎障害, 末梢神経障害・難聴, 血液毒性粘膜炎, 下痢, 心障害
DC ⁴	DTX 75 mg/m ² 1h で DIV day 1 CDDP 75 mg/m ² 2h で DIV day 1 3 w 毎 4-6 コース	53%	Not reported	11 m	High	血液毒性 (特に好中球減少), 浮腫, 体液貯留腎障害, 末梢神経障害・難聴, 血液毒性
Weekly PTX ⁵	PTX 100 mg/m ² 1h で DIV day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 7-8 w 毎	29%	3.4 m	14.3 m	High Low	末梢神経障害, アレルギー反応
Tri-weekly DTX ⁶	DTX 60 mg/m ² 1h で DIV day 1, 3 w 毎	25%	1.7 m	4.6 m	Low	血液毒性 (特に好中球減少), 浮腫, 体液貯留
S-1 ⁷	BSA-1.25 m ² 40 mg 2 回/日 day 1-28 BSA 1.25-1.5 m ² 50 mg 2 回/日 day 1-28 BSA 1.5 m ² - 60 mg 2 回/日 day 1-28, 6 w 毎	63%	4.9 m	13.2 m	Low	粘膜炎, 下痢, 血液毒性 (特に好中球減少), 皮膚色素沈着