お詫びと訂正

書籍『AKI（急性腎障害）診療ガイドライン 2016』におきまして以下の間違いがございました。
誤りをお詫び申し上げ，謹んで訂正いたします。

xii 頁「AKI（急性腎障害）診療ガイドライン作成委員会」中

（誤）古久　保拓

（正）古久保　拓

003 頁「CQ2-1」中，表 2，表 3（赤丸部分）

（誤）

表 2　AKIN 基準

定義	1. ΔsCr≧0.3 mg/dL (48 時間以内) 2. sCr の基礎値から 1.5 倍上昇 (48 時間以内) 3. 尿量 0.5 mL/kg/時以下が 6 時間以上持続	
	sCr 基準	尿量基準
ステージ 1	ΔsCr >0.3 mg/dL or sCr 1.5 ～ 2.0 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 6 時間以上
ステージ 2	sCr 2.0 ～ 3.0 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 12 時間以上
ステージ 3	sCr 3.0 倍～上昇 or sCr>4.0 mg/dL までの上昇 or 腎代替療法開始	0.3 mL/kg/時未満 24 時間以上　or 12 時間以上の無尿

sCr：血清クレアチニン
注）定義 1 ～ 3 の一つを満たせば AKI と診断する。尿量のみで診断する際は，尿路閉塞や容易に回復可能な乏尿は除外され，体液量が適切に是正された条件で診断基準を用いる。

表 3　KDIGO 診療ガイドラインによる AKI 診断基準と病期分類

定義	1. ΔsCr≧0.3 mg/dL (48 時間以内) 2. sCr の基礎値から 1.5 倍上昇 (7 日以内) 3. 尿量 0.5 mL/kg/時以下が 6 時間以上持続	
	sCr 基準	尿量基準
ステージ 1	ΔsCr>0.3 mg/dL or sCr 1.5 ～ 1.9 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 6 時間以上
ステージ 2	sCr 2.0 ～ 2.9 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 12 時間以上
ステージ 3	sCr 3.0 倍上昇 or sCr>4.0 mg/dL までの上昇 or 腎代替療法開始	0.3 mL/kg/時未満 24 時間以上 or 12 時間以上の無尿

sCr：血清クレアチニン
注）定義 1 ～ 3 の一つを満たせば AKI と診断する。sCr と尿量による重症度分類では重症度の高いほうを採用する。

（正）

表 2　AKIN 基準

定義	1. ΔsCr≧0.3 mg/dL (48 時間以内) 2. sCr の基礎値から 1.5 倍上昇 (48 時間以内) 3. 尿量 0.5 mL/kg/時以下が 6 時間以上持続	
	sCr 基準	尿量基準
ステージ 1	ΔsCr ≧0.3 mg/dL or sCr 1.5 ～ 2.0 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 6 時間以上
ステージ 2	sCr 2.0 ～ 3.0 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 12 時間以上
ステージ 3	sCr 3.0 倍～上昇 or sCr≧4.0 mg/dL までの上昇 or 腎代替療法開始	0.3 mL/kg/時未満 24 時間以上　or 12 時間以上の無尿

sCr：血清クレアチニン
注）定義 1 ～ 3 の一つを満たせば AKI と診断する。尿量のみで診断する際は，尿路閉塞や容易に回復可能な乏尿は除外され，体液量が適切に是正された条件で診断基準を用いる。

表 3　KDIGO 診療ガイドラインによる AKI 診断基準と病期分類

定義	1. ΔsCr≧0.3 mg/dL (48 時間以内) 2. sCr の基礎値から 1.5 倍上昇 (7 日以内) 3. 尿量 0.5 mL/kg/時以下が 6 時間以上持続	
	sCr 基準	尿量基準
ステージ 1	ΔsCr≧0.3 mg/dL or sCr 1.5 ～ 1.9 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 6 時間以上
ステージ 2	sCr 2.0 ～ 2.9 倍上昇	0.5 mL/kg/時未満 12 時間以上
ステージ 3	sCr 3.0 倍上昇 or sCr≧4.0 mg/dL までの上昇 or 腎代替療法開始	0.3 mL/kg/時未満 24 時間以上 or 12 時間以上の無尿

sCr：血清クレアチニン
注）定義 1 ～ 3 の一つを満たせば AKI と診断する。sCr と尿量による重症度分類では重症度の高いほうを採用する。